

QUICK RELEASE SPRING ASSIST DOBBS BAR Múnla QDCB Beag agus Rialta

Tásca le haghaidh Úsáide:

Tar éis do chos do pháiste a cheartú, cuireann cosc ar fhuadach chos Dobbs Bar cosc ar athiompairthe tríd an chos a choinneáil sa suíomh ceartaithe.

NÓTA: Ná cuir an brace seo i bhfeidhm ar chos neamhcheartaithe. Ní cheartaíonn an brace cam reilige, ní choinníonn sé ach an ceartú a bhaintear amach le Modh cóireála Ponseti (modh a úsáideann sraith de theilgthe sraitheach chun cam reilige a cheartú de réir a chéile).

Treoracha Úsáide:

Ba chóir an Dobbs Bar a chaitheamh 23 uair sa lá ar feadh na chéad 3 mhí agus ansin san oíche agus snaps ar feadh 2 go 4 bliana. Tá bracing ríthábhachtach chun ceartú cam reilige a choinneáil. Mura gcaitear an brace mar a fhorordaítear, tá ráta atarlú beagnach 100 faoin gcéad ann.

Rabhaidh agus réamhchúraimí:

Ná húsáid Loctite ná táirgí eile de chineál superglue riamh ar na scriúna sa Dobbs Bar. Imoibríonn an superglue / Loctite leis an plaisteach polacarbonáit agus cuirfidh sé an plaisteach ag lagú agus ag briseadh.

An Dobbs Bar a Chur ar bun

Leithead an bharr a shocrú:

Ba chóir an Dobbs Bar a shocrú ionas go mbeidh leithead an bharr cothrom le leithead ghualainn an linbh. Tomhais leithead ghualainn an linbh ón ghualainn chlé lasmuigh go dtí an ghualainn dheis lasmuigh. Coigeartaigh fad an Bharra Dobbs ionas go mbeidh fad an bharr cothrom le do thomhas leithead ghualainn ó lár sála an phláta chlé go lár sála an phláta chos dheas. Is fearr an barra a bheith beagán níos leithne ná leithead an ghualainn seachas a bheith ró-chúng. Tá sé míchompordach don leanbh má tá fad an bharr ró-chúng.

Ag baint úsáide as an eochair heics a chuirtear ar fáil sa phacáiste, scaoil na scriúna ceann heicse ar an gclampar lár agus sleamhnaigh leithead na barraí ar oscailt go dtí go mbeidh siad comhoiriúnach le leithead ghualainn an linbh. Nuair atá an leithead ceart, déan an scriú / na scriúna ceann heics a aisghabháil chun na barraí a ghlasáil go daingean ina n-áit.

An rothlú seachtrach a shocrú:

Ba chóir an chos nó an cam reilige atá buailte a shocrú ag 60 céim de rothlú seachtrach, níor cheart an taobh ar bith a bhfuil tionchar air a shocrú ag 30 céim nó rothlú seachtrach. Maidir le cam reilige déthaobhach ba chóir an dá chos a shocrú go 60 céim. Ba cheart go mbeadh uillinn an uainíochta sheachtraigh comhoiriúnach le méid an uainíochta sheachtraigh a baineadh amach sa teilgthe deireanach. Mar shampla, mura raibh an dochtúir in ann an chos a raibh tionchar air a cheartú go 50 céim ansin ba chóir an brace a shocrú go 50 céim. Scaoil an scriú ceann Heics i lár an lámh sclóine dubh agus rothlaigh an píosa dearg “Y” amach go dtí go dtéann an pointeoir ar an lámh sclóine dubh suas leis an socrú céime ceart ar an bpíosa dearg “Y”. Déan an scriú a aisghabháil chun glasáil san uillinn atá ag teastáil ó rothlú seachtrach.

Scaoil an scriú ceann Heics i lár an lámh sclóine dubh agus rothlaigh an píosa dearg “Y” amach go dtí go dtéann an pointeoir ar an lámh sclóine dubh suas leis an socrú céime ceart ar an bpíosa dearg “Y”. Déan an scriú a aisghabháil chun glasáil san uillinn atá ag teastáil ó rothlú seachtrach.

Ag gabháil an phláta coise leis na bróga nó AFO:

Ceangail an pláta coise dubh le bun na bróga Markell / AFO tríd an dá pholl frithchúitimh sa phláta coise dubh a líneáil leis an dá pholl ar bhun na bróga. Ag baint úsáide as na scriúna ceann caighdeánach a chuirtear ar fáil, níos doichte scriú amháin leath bealaigh, ansin níos doichte an scriú eile go hiomlán. Ansin téigh ar ais agus níos doichte an chéad scriú an bealach ar fad.

Ag baint úsáide as an ngné tapa dícheangail:

Nuair a bheidh an pláta coise ceangailte leis na bróga, sleamhnaigh an pláta coise dubh ar an dá ghearrthóg dhearga agus sleamhnaigh an pláta coise ar aghaidh chun plunger an earraigh a fhostú agus na bróga a ghlasáil ina n-áit. Chun na bróga a scaoileadh, tarraing an plunger luchtaithe san earrach agus tú ag brú an phláta ar gcúl i dtreo sála an linbh.